

Léa Cohen animatrice LLL Paris English, consultante en Lactation IBCLC.

DAL : Situations d'utilisation

Le DAL, dispositif d'aide à la lactation (SNS, Lact-Aid ou DAL fait maison) est recommandé et utilisé dans plusieurs situations où d'autres interventions ont échoué ou pour prévenir une augmentation de complications.

A. Difficultés de succion chez l'enfant. Les enfants dont la succion est faible, désorganisée ou dysfonctionnelle sont des candidats potentiels pour le DAL. Ceci comprend:

1. les enfants hyperactifs ou hypotoniques
2. les enfants trisomiques (Down's syndrome)
3. les enfants avec une fente de lèvre et/ou une fente palatine
4. les prématurés
5. les enfants avec des problèmes cardiaques
6. les enfants avec des difficultés neurologiques
7. les enfants qui ne prennent pas de poids à cause d'une succion inefficace (problèmes de palais ou frenulum parfois)
8. les enfants léthargiques à l'hôpital qui risquent une diminution de la prise alimentaire, une augmentation du niveau de bilirubine ou une supplémentation d'eau sucrée au biberon.

B. Des situations maternelles.

1. les mères adoptives et les mères ayant utilisée une mère porteuse
2. relactation (après une séparation ou une interruption)
3. les mères qui ont eu une chirurgie du sein (réduction/augmentation/biopsie)
4. les mères qui souffrent d'une insuffisance primaire de lactation (manque de tissu fonctionnel)
5. les mères qui souffrent d'un trauma sévère au bout de sein
6. les mères qui ont absorbé un médicament contre-indiqué pour l'enfant allaité
7. les mères qui souffrent d'une maladie ou qui subissent une chirurgie ou une hospitalisation
8. les mères qui ont des bouts de seins ombiliqués ou plats dont l'enfant ne parvient pas à prendre le sein