

Diagnostic d'une ankyloglossie importante :

- résultat pour les critères anatomiques ≤ 8 ,
- ou résultat pour le fonctionnement ≤ 11 .

TABLEAU P-3 : Echelle Hazelbaker pour l'évaluation du fonctionnement du frein lingual*

* La langue du nourrisson est examinée selon les 5 critères de configuration et les 7 critères de fonctionnement. Une ankyloglossie importante est diagnostiquée lorsque le résultat total pour la configuration est inférieur ou égal à 8 et/ou le résultat total pour le fonctionnement est inférieur ou égal à 11^{2,3}.

Adapté avec la permission d'Hazelbaker AK (The assessment tool for lingual frenulum function (ATLPP) : Use in a lactation consultant practice Master thesis, Pacific Oaks College, 1993).

Apparence	Fonctionnement
<p>Aspect de la langue lorsque celle-ci est soulevée 2 : ronde ou carrée 1 : petit sillon visible au bout de la langue 0 : en forme de coeur ou en V</p>	<p>Latéralisation 2 : complète 1 : corps de la langue mais pas la pointe 0 : aucune</p>
<p>Élasticité du frein 2 : grande élasticité 1 : élasticité modérée 0 : élasticité minimale ou inexistante</p>	<p>Élévation de la langue 2 : de la pointe au centre de la bouche 1 : seulement les bords jusqu'au centre de la bouche 0 : la pointe reste au niveau de la crête alvéolaire et n'atteint le centre de la bouche que lors de la fermeture des mâchoires.</p>
<p>Longueur du frein lingual lorsque la langue est soulevée 2 : >1 cm 1 : 1 cm 0 : <1 cm</p>	<p>Extension de la langue 2 : la pointe dépasse la lèvre inférieure 1 : la pointe dépasse uniquement la gencive inférieure 0 : aucun des deux premiers cas ou bien bosses au milieu de la langue ou avant.</p>
<p>Zone d'attache du frein lingual à la langue 2 : postérieure à la pointe de la langue 1 : au niveau de la pointe 0 : adhérence de la pointe</p>	<p>Extension de la langue antérieure 2 : complète 1 : modérée ou partielle 0 : faible ou inexistante</p>
<p>Zone d'attache du frein lingual à la crête alvéolaire inférieure 2 : adhérence au plancher de la bouche ou bien avant l'arête 1 : adhérence juste sous l'arête 0 : adhérence au niveau de l'arête</p>	<p>Creusement 2 : de toute la langue, nettement en gouttière 1 : des côtés seulement, légèrement en gouttière 0 : creusement faible ou inexistant</p>
	<p>Péristaltisme 2 : complet, de la partie antérieure à la partie postérieure 1 : partiel, débutant postérieurement à la pointe de la langue 0 : aucun, ou mouvement inverse</p>
	<p>Retour à une position de repos 2 : jamais 1 : périodiquement 0 : fréquemment ou à chaque succion</p>